



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
DE L'AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

infoma

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction Générale de l'Alimentation
251 rue de Vaugirard
75732 PARIS Cedex 15



[Retour sommaire
caille](#)

CARCASSE CADAVERIQUE

Espèce : CAILLE

Code NERGal

?

Type d'anomalie : anomalie de couleur

Synonyme(s) et anomalie(s) apparentée(s) : animal mort avant abattage, carcasse bleue (cyanose, asphyxie)



Conduite à tenir

Motivation en droit

Règlement CE 854/2004, annexe I, section II, chapitre V, 1.c)

Retrait total



L'accrochage d'animaux morts sur la chaîne est
INTERDIT

Catégorie de sous-produits

2



Description macroscopique et répercussion sur la carcasse	Coloration rouge sombre à violacé uniforme. Vaisseaux sanguins gorgés de sang Muscles flasques Odeur stercorale à l'ouverture de la cavité abdominale Souvent associé à un défaut de plumaison
Etiologie(s) possible(s)	Toute cause de mort avant l'abattage Souvent dû à une asphyxie en cours de transport
Fréquence indicative d'observation (pour le plus fréquent : +++)	+
DéTECTABILITÉ sur la chaîne en cadence d'abattage (rôle de la cadence d'abattage)	OUI
Impact sur la santé publique humaine et/ou animale	OUI
Ne pas confondre	Carcasse congestive Carcasse saigneuse Défaut de plumaison



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
DE L'AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

infoma

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction Générale de l'Alimentation
251 rue de Vaugirard
75732 PARIS Cedex 15



[Retour sommaire
caille](#)

CARCASSE SAIGNEUSE

Espèce : CAILLE

Code NERGA

?

Type d'anomalie : anomalie de couleur / anomalie d'origine technologique

Synonyme(s) et anomalie(s) apparentée(s) : mauvaise saignée, absence de saignée, saignée insuffisante



Conduite à tenir

Motivation en droit

Règlement CE 854/2004, annexe I, section II, chapitre V, 1.p)

Retrait partiel si limité au cou

sinon

Retrait total**Catégorie de sous-produits****3b****Description macroscopique et répercussion sur la carcasse**

Couleur rouge vif plus ou moins étendue, surtout en partie déclive (tête, cou, ailes). Possibilité de piqueté hémorragique
Vaisseaux sanguins gorgés de sang
Peut s'étendre sur l'intégralité de la zone ventrale

Étiologie(s) possible(s)

Défaut technologique : absence de saignée ou saignée insuffisante.

Fréquence indicative d'observation (pour le plus fréquent : +++)

+

Délectabilité sur la chaîne en cadence d'abattage (rôle de la cadence d'abattage)

OUI

Impact sur la santé publique humaine et/ou animale

NON

Ne pas confondre[Carcasse congestive](#)[Carcasse cadavérique](#)



CARCASSE CONGESTIVE

Espèce : CAILLE


**Code NERGal
?**

Type d'anomalie : anomalie de couleur / infectieuse / inflammatoire / circulatoire / carencielle

Synonyme(s) et anomalie(s) apparentée(s) : carcasse rouge ; inclut les carcasses surmenées, congestion généralisée.




Carcasse normale



cachexie

Congestion +
Congestion + défaut plumaison



Carcasse congestive



Conduite à tenir

Motivation en droit

Règlement CE 854/2004, annexe I, section II, chapitre V, 1.f) si lésions inflammatoires associées, sinon 1.p)

Retrait total

Catégorie de sous-produits

2



Description macroscopique et répercussion sur la carcasse

Carcasse uniformément rosée à violacée, coloration plus marquée au niveau des cuisses.
Aspect sec de la peau.
Souvent associé à un défaut de plumaison .

Etiologie(s) possible(s)

Maladies infectieuses en phase septicémique : Forme aigüe du Choléra aviaire (*Pasteurella multocida*), Rouget (*Erysipelothrix rhusopathiae*), Colibacillose (*Escherichia coli*), Yersiniose (*Yersinia pseudotuberculosis*).
Animaux surmenés (stress, coup de chaleur) ;

Fréquence indicative d'observation (pour le plus fréquent : +++)

+++

DéTECTABILITÉ sur la chaîne en cadence

d'abattage (rôle de la cadence d'abattage)	OUI
Impact sur la santé publique humaine et/ou animale	OUI (si origine infectieuse)
Ne pas confondre	Carcasse saigneuse Carcasse cadavérique Hématomes - fractures



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
DE L'AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

infoma

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction Générale de l'Alimentation
251 rue de Vaugirard
75732 PARIS Cedex 15



[Retour sommaire
caille](#)

ACCUMULATION LIQUIDIENNE DANS LA CAVITE ABDOMINALE

Espèce : CAILLE

**Code NERGA
?**

Type d'anomalie : anomalie de conformation /
inflammatoire / circulatoire / infectieuse / carencielle

Synonyme(s) et anomalie(s) apparentée(s) : ascite,
épanchement péritonéal



Conduite à tenir

Motivation en droit

Règlement CE 854/2004, annexe I, section II, chapitre V, 1.f) pour maladie généralisée ou 1.p)

Retrait total

Catégorie de sous-produits
2



Description macroscopique et répercussion

Carcasse gonflée en zone abdominale et contenant un liquide plus ou moins translucide, jaune ambré et gélatineux.

sur la carcasse	Souvent associé à une anomalie de texture et/ou de couleur du foie, du cœur et/ou de la cachexie.
Etiologie(s) possible(s)	Insuffisance hépatique (hépatite sévère, amyloïdose hépatique) ou cardiaque (péricardite, malformation congénitale sévère)
Fréquence indicative d'observation (pour le plus fréquent : +++)	+
Déteçtabilité sur la chaîne en cadence d'abattage (rôle de la cadence d'abattage)	OUI
Impact sur la santé publique humaine et/ou animale	OUI
Ne pas confondre	Eau de lavage interne/externe dans la cavité abdominale ou sous la peau Carcasse gonflée Anomalie de la paroi de la cavité abdominale ou de la masse viscérale



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
DE L'AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

infoma

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction Générale de l'Alimentation
251 rue de Vaugirard
75732 PARIS Cedex 15



[Retour sommaire
caille](#)


ARTHRITE UNIQUE

Espèce : CAILLE

**Code NERGal
?**

Type d'anomalie : anomalie de conformation /
inflammatoire / infectieuse localisée

Synonyme(s) et anomalie(s) apparentée(s) : arthrite
synovite unilatérale, ténosynovite



Conduite à tenir

Motivation en droit

Règlement CE 854/2004, annexe I, section II, chapitre V, 1.p)

Catégorie de sous-produits

Retrait Partiel

2

**Description macroscopique et répercussion sur la carcasse**

Articulation gonflée, déformée, dure, de coloration anormale.
Parfois associée à une lésion cutanée en regard de l'articulation et/ou une atrophie des muscles du membre atteint

Etiologie(s) possible(s)

Infection de l'articulation, soit par inoculation via une effraction de l'articulation, soit par dissémination sanguine (Choléra, mycoplasmosse, colibacillose, pullorose chronique, aspergillose chronique)

Fréquence indicative d'observation (pour le plus fréquent : +++)

+

Délectabilité sur la chaîne en cadence d'abattage (rôle de la cadence d'abattage)

OUI

Impact sur la santé publique humaine et/ou animale

OUI

Ne pas confondre

[Hématome, fracture](#)
[Arthrites multiples](#)
[Lésion cutanée infectée](#)
[Autres anomalies de conformation](#)



infoma

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction Générale de l'Alimentation
251 rue de Vaugirard
75732 PARIS Cedex 15



[Retour sommaire
caille](#)


ARTHRITES MULTIPLES

Espèce : CAILLE

**Code NERGal
?**

Type d'anomalie : anomalie de conformation / maladie infectieuse généralisée

Synonyme(s) et anomalie(s) apparentée(s) : arthrite synovite bilatérale, polyarthrite





Conduite à tenir

Motivation en droit

Règlement CE 854/2004, annexe I, section II, chapitre V, 1.p)

Retrait total

Catégorie de sous-produits
2



Description macroscopique et répercussion sur la carcasse

Plusieurs articulations gonflées, déformées, dures, de coloration anormale.
Parfois associé à de la cachexie ou une carcasse congestive

Etiologie(s) possible(s)

Maladies infectieuses septicémiques (choléra, rouget)

Fréquence indicative d'observation (pour le plus fréquent : +++)

+

Délectabilité sur la chaîne en cadence d'abattage

OUI

Impact sur la santé publique humaine et/ou animale

OUI

Ne pas confondre

[Autres anomalies de conformation](#)
[Hématome, fracture](#)
[Arthrite unique](#)
[Lésion cutanée infectée](#)



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
DE L'AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

infoma

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction Générale de l'Alimentation
251 rue de Vaugirard
75732 PARIS Cedex 15



[Retour sommaire
caille](#)

CACHEXIE

Espèce : CAILLE

**Code NERGAL
?**

Type d'anomalie : anomalie de conformation

Synonyme(s) et anomalie(s) apparentée(s) :



Carcasse normale





cachectique

Carcasse



Conduite à tenir

Motivation en droit

Règlement CE 854/2004, annexe I, section II, chapitre V, 1.q)

Retrait total

Catégorie de sous-produits
2



Description macroscopique et répercussion sur la carcasse	Amyotrophie associée à une disparition du tissu adipeux. Souvent associée à une carcasse congestive et/ou un défaut de plumaison
Etiologie(s) possible(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Maladies infectieuses ou parasitaires chroniques - Compétition alimentaire. - Carences alimentaires
Fréquence indicative d'observation (pour le plus fréquent : +++)	+++
DéTECTABILITÉ sur la chaîne en cadence d'abattage (rôle de la cadence d'abattage)	OUI

Impact sur la santé publique humaine et/ou animale	OUI
Ne pas confondre	Avec des anomalies n'entraînant pas de saisie : maigreur, petite carcasse bien conformée... Carcasse congestive Défaut de plumaison

 <p>LIBERTÉ • ÉGALITÉ • FRATERNITÉ REPUBLIQUE FRANÇAISE</p> <p>MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT</p>		<p>Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Direction Générale de l'Alimentation 251 rue de Vaugirard 75732 PARIS Cedex 15</p>	 <p>Retour sommaire caille</p>
---	---	--	---

CARCASSE GONFLEE

Espèce : CAILLE

**Code NERGAL
?**

Type d'anomalie : anomalie de conformation /
traumatique / infectieuse généralisée

Synonyme(s) et anomalie(s) apparentée(s) : volaille en
«ballon de baudruche»,
emphysème sous-cutané



Conduite à tenir

Motivation en droit

Règlement CE 854/2004, annexe I, section II, chapitre V, 1.f) si autres lésions associées, 1.p)

Retrait total

**Catégorie de sous-produits
2**



**Description macroscopique et répercussion
sur la carcasse**

Aspect gonflé de la carcasse.
Surélévation de la peau due à l'accumulation de gaz dans les tissus
sous-cutanés (emphysème sous-cutané).

Etiologie(s) possible(s)

Lésions accidentelles des sacs aériens.
Fractures en communication avec les sacs aériens.

	Aérosacculite (mycoplasmosse, colibacillose respiratoire, aspergillose chronique, bronchite infectieuse de la caille).
Fréquence indicative d'observation (pour le plus fréquent : +++)	+
Délectabilité sur la chaîne en cadence d'abattage (rôle de la cadence d'abattage)	OUI
Impact sur la santé publique humaine et/ou animale	OUI
Ne pas confondre	Accumulation liquidienne dans la cavité abdominale Autres anomalies de conformation



infoma

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction Générale de l'Alimentation
251 rue de Vaugirard
75732 PARIS Cedex 15



[Retour sommaire
caille](#)

AUTRES ANOMALIES DE CONFORMATION

Espèce : CAILLE

Code NERGal

?

Type d'anomalie : anomalie de conformation

Synonyme(s) et anomalie(s) apparentée(s) : monstres, rachitisme (carence en vitamine D), ostéodystrophie, pérosis, amyotrophie



Carcasse rachitique (à droite)



Conduite à tenir

Motivation en droit

Règlement CE 854/2004, annexe I, section II, chapitre V, 1.p) ou 1.f) si maladie généralisée

Retrait partiel
ou
Retrait total
selon l'étendue de l'anomalie

Catégorie de sous-produits
3b



Description macroscopique et répercussion sur la carcasse

Déformation osseuse sans fracture :
- Perosis : déviation des tarses vers l'extérieur, généralement bilatérale,
- Rachitisme : déformation des os longs
Monstre : malformations congénitales diverses
Souvent associé à de la cachexie

Etiologie(s) possible(s)

Carence (vitamine E, ...)
Erreur zootechnique au démarrage (surchauffe)
Malformations congénitales

Fréquence indicative d'observation (pour le plus fréquent : +++)

+

Délectabilité sur la chaîne en cadence d'abattage (rôle de la cadence d'abattage)

OUI

Impact sur la santé publique humaine et/ou animale

NON

Ne pas confondre

[Hématome, fracture](#)
Arthrite(s) [unique](#) ou [multiples](#)
[Lésion cutanée infectée](#)



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
DE L'AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

infoma

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction Générale de l'Alimentation
251 rue de Vaugirard
75732 PARIS Cedex 15



[Retour sommaire
caille](#)

LESIONS CUTANÉES INFECTÉES

Espèce : CAILLE

**Code NERGal
?**

Type d'anomalie : anomalie d'aspect / inflammatoire /
infectieuse

Synonyme(s) et anomalie(s) apparentée(s) :





Conduite à tenir

Motivation en droit

Règlement CE 854/2004, annexe I, section II, chapitre V, 1.p) ou 1.f (maladie généralisée)

Retrait partiel ou total en fonction de l'étendue

Attention aux contaminations de la chaîne d'abattage



A intégrer dans le plan HACCP

Catégorie de sous-produits

2



Description macroscopique et répercussion sur la carcasse

- lésions cutanées purulentes, nécrotiques, caséuses ou gangréneuses,
- +/- lésion purulente, fibrineuse ou œdémateuse du tissu sous-cutané
- +/- atteinte congestive, séro-hémorragique ou nécrotique des muscles en regard de la lésion cutanée

Etiologie(s) possible(s)

Complication d'une lésion tissulaire par un agent infectieux (colibacille, staphylocoque, germe anaérobie...)

Fréquence indicative d'observation (pour le plus fréquent : +++)

+ + +

DéTECTABILITÉ sur la chaîne en cadence d'abattage

OUI

(rôle de la cadence d'abattage)	
Impact sur la santé publique humaine et/ou animale	OUI
Ne pas confondre	Lésion cutanée non infectée Déchirure de la peau, muscles et cassure osseuse



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
DE L'AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

infoma

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction Générale de l'Alimentation
251 rue de Vaugirard
75732 PARIS Cedex 15



[Retour sommaire
caille](#)

LESION CUTANEE NON INFECTEE

Espèce : CAILLE

**Code NERGA
?**

Type d'anomalie : anomalie d'aspect / infectieuses

Synonyme(s) et anomalie(s) apparentée(s) : inclut =
plaies, croûtes, pustules, escarres,



Conduite à tenir

Motivation en droit

Règlement CE 854/2004, annexe I, section II, chapitre V, 1.p)

Retrait partiel ou retrait total

en fonction de l'étendue des lésions



Rechercher les causes si beaucoup d'animaux atteints
(bien être animal...)

Catégorie de sous-produits
3b



Description macroscopique et répercussion sur la carcasse	- Lésions cutanées linéaires, généralement nombreuses et dirigées parallèlement à l'axe de l'animal, souvent localisées sur le bas du dos, des cuisses : lésions de griffage
Etiologie(s) possible(s)	Griffage : nervosité des animaux (défaut de programme lumineux, ectoparasites)
Fréquence indicative d'observation (pour le plus fréquent : +++)	+ +
Délectabilité sur la chaîne en cadence d'abattage (rôle de la cadence d'abattage)	OUI
Impact sur la santé publique humaine et/ou animale	
Ne pas confondre	Lésion cutanée infectée Déchirure peau, muscles et cassure osseuse



infoma

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction Générale de l'Alimentation
251 rue de Vaugirard
75732 PARIS Cedex 15



[Retour sommaire
caille](#)

DECHIRURE PEAU-MUSCLES ET CASSURES OSSEUSES

Espèce : CAILLE

**Code NERGal
?**

Type d'anomalie : anomalie d'aspect / d'origine
technologique

Synonyme(s) et anomalie(s) apparentée(s) : inclus
déchirure peau-muscles,
délabrement carcasse, luxation, écartèlement, effleurage





Déchirure

Effleurage léger





Conduite à tenir

Motivation en droit

Règlement CE 854/2004, annexe I, section II, chapitre V, 1.p)

Déclassement,
retrait partiel à retrait total
selon l'extension de l'anomalie



Revoir les modalités de réglage des machines

Catégorie de sous-produits
3b, 2 si souillures



**Description macroscopique et répercussion
sur la carcasse**

Délabrement de la carcasse, jusqu'à la luxation ou cassures osseuses.
Mise à nu des muscles, voire ouverture de la cavité abdominale.

Etiologie(s) possible(s)

Défaut mécanique de la chaîne d'abattage (défaut de réglage des
doigts de la plumeuse).

**Fréquence indicative d'observation
(pour le plus fréquent : +++)**

+

**DéTECTABILITÉ sur la chaîne en cadence
d'abattage
(rôle de la cadence d'abattage)**

OUI

**Impact sur la santé publique humaine et/ou
animale**

NON

Ne pas confondre

[Lésion cutanée non infectée](#)
[Lésion cutanée infectée](#)
[Hématome, fracture](#)
[Autres anomalies de conformation](#)
[Souillure d'origine intrinsèque ou extrinsèque](#)

 <p>REPUBLIQUE FRANÇAISE</p> <p>MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT</p>		<p>Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Direction Générale de l'Alimentation 251 rue de Vaugirard 75732 PARIS Cedex 15</p>	 <p>Retour sommaire caille</p>
--	---	---	---

DEFAUT DE PLUMAIISON

Espèce : CAILLE

Code NERGAL ?

Type d'anomalie : anomalied'aspect / d'origine technologique

Synonyme(s) et anomalie(s) apparentée(s) : mauvaise plumaison, plumaison incomplète, sicots



Défaut de plumaison, associé à cachexie et congestion



Conduite à tenir

Motivation en droit

Règlement CE 854/2004, annexe I, section II, chapitre V, 1.p)

Retrait partiel, retrait total, reprise de plumaison, selon étendue du défaut



Rechercher la cause de l'anomalie et correction par l'industriel.




Catégorie de sous-produits

3b



Description macroscopique et répercussion sur la carcasse	Présence de plumes ou de sicots en sortie de plumeuse
Etiologie(s) possible(s)	Défaut de fonctionnement ou de réglage de la plumeuse Lot hétérogène Température du bac d'échaudage trop basse
Fréquence indicative d'observation (pour le plus fréquent : +++)	+ +
DéTECTABILITÉ sur la chaîne en cadence d'abattage (rôle de la cadence d'abattage)	OUI
Impact sur la santé publique humaine et/ou animale	NON
Ne pas confondre	Carcasse cadavérique Carcasse congestive

 <p>Liberté • Égalité • Fraternité REPUBLIQUE FRANÇAISE</p> <p>MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT</p>		<p>Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Direction Générale de l'Alimentation 251 rue de Vaugirard 75732 PARIS Cedex 15</p>	 <p>Retour sommaire caille</p>
<h2 style="color: red;">ANOMALIES LIEES A L'ECHAUDAGE</h2>			
<p>Espèce : CAILLE</p>		<p>Code NERGA ?</p>	
<p>Type d'anomalie : anomalie d'aspect / d'origine technologique</p>		<p>Synonyme(s) et anomalie(s) apparentée(s) : échaudage excessif</p>	
			
 <p>Conduite à tenir</p>			
<p>Motivation en droit Règlement CE 854/2004, annexe I, section II, chapitre V, 1.p)</p>			
<p>Retrait total ou partiel en fonction de l'étendue</p> 		<p>Catégorie de sous-produits 3b</p>	

Revoir le réglage des équipements



Description macroscopique et répercussion sur la carcasse	Plaques brunâtres, dures, lisses sur la peau et aspect cuit des muscles sous-jacents. Coloration brunâtre s'amplifiant au froid
Etiologie(s) possible(s)	Cuisson partielle de la carcasse due à une anomalie du bac d'échaudage (Température trop élevée, temps dans le bac trop long)
Fréquence indicative d'observation (pour le plus fréquent : +++)	+
Délectabilité sur la chaîne en cadence d'abattage (rôle de la cadence d'abattage)	OUI
Impact sur la santé publique humaine et/ou animale	NON
Ne pas confondre	Effleurage léger. Lésion cutanée infectée Souillure extrinsèque ou intrinsèque



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
DE L'AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

infoma

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction Générale de l'Alimentation
251 rue de Vaugirard
75732 PARIS Cedex 15



[Retour sommaire
caille](#)


HEMATOMES - FRACTURES

Espèce : CAILLE

**Code NERGal
?**

Type d'anomalie : anomalie d'aspect / traumatique

Synonyme(s) et anomalie(s) apparentée(s) : infiltration
hémorragique, séro-hémorragique,
luxation, écartèlement





Conduite à tenir

Motivation en droit

Règlement CE 854/2004, annexe I, section II, chapitre V, 1.p)

Retrait partiel ou **retrait total**
en fonction de l'étendue de l'anomalie

Catégorie de sous-produits
3b



Description macroscopique et répercussion sur la carcasse	- Peau rouge violacé à verdâtre, légèrement surélevée +/- en regard d'une fracture - Parfois, coloration anormale au niveau des fémurs, souvent bilatérale, violacée à verdâtre associée à des fractures des fémurs
Etiologie(s) possible(s)	Traumatismes +/- récents en élevage, pendant le ramassage, le transport, le déchargement.
Fréquence indicative d'observation (pour le plus fréquent : +++)	+ +
DéTECTABILITÉ sur la chaîne en cadence d'abattage (rôle de la cadence d'abattage)	OUI
Impact sur la santé publique	NON
Ne pas confondre	Déchirure peau, muscles, et cassure osseuse Souillure extrinsèque ou intrinsèque Congestion généralisée

 REPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT		Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Direction Générale de l'Alimentation 251 rue de Vaugirard 75732 PARIS Cedex 15	 Retour sommaire caille
---	---	--	---

SOUILLURE INTRINSEQUE OU EXTRINSEQUE

Espèce : CAILLE

**Code NERGal
?**

Type d'anomalie : anomalie d'aspect / d'origine technologique

Synonyme(s) et anomalie(s) apparentée(s) : carcasse souillée



Souillure intrinsèque



Conduite à tenir

Motivation en droit

Règlement CE 854/2004, annexe I, section II, chapitre V, 1.n) pour corps étrangers

1.s) pour autres souillures
1.u) pour autres cas si nécessaire

Retrait partiel ou **retrait total**
en fonction de l'étendue de l'anomalie



Catégorie de sous-produits
2



Description macroscopique et répercussion sur la carcasse

Souillure par les fèces : matières fécales brun marron sur la carcasse et odeur caractéristique
Souillure par la bile : coloration vert intense
Souillure par des graisses mécaniques : tâches noires visqueuses sur l'extérieur de la carcasse et odeur caractéristique

Etiologie(s) possible(s)

Technique défectueuse de plumaison et/ou d'éviscération.
Contact des carcasses avec des structures souillantes.
Défaut de mise à jeun.
Lot hétérogène.

Fréquence indicative d'observation
(pour le plus fréquent : +++)

+

Déteçtabilité sur la chaîne en cadence d'abattage
(rôle de la cadence d'abattage)

OUI

Impact sur la santé publique humaine et/ou animale

OUI

Ne pas confondre

[Hématome, fracture](#)



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
DE L'AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

infoma

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction Générale de l'Alimentation
251 rue de Vaugirard
75732 PARIS Cedex 15



[Retour sommaire
caille](#)

AEROSACCULITE

Espèce : CAILLE

Code NERGal

?

Type d'anomalie : anomalies des viscères /
inflammatoire / infectieuse

Synonyme(s) et anomalie(s) apparentée(s) :
inflammation et infection des sacs aériens



Conduite à tenir

Motivation en droit

Règlement CE 854/2004, annexe I, section II, chapitre V, 1.f)

Retrait total si stade aigu

Catégorie de sous-produits

Retrait partiel si stade chronique
(grappe viscérale complète)

2



Description macroscopique et répercussion sur la carcasse	<p>Perte de transparence des sacs aériens</p> <ul style="list-style-type: none"> - stade aigu : sacs aériens rouges ou contenant du pus (liquide crémeux, jaunâtre ou malodorant) ou de la fibrine (contenu jaune, friable, sec) - stade chronique : les sacs aériens présentant des zones de fibroses, très dures et opaques. <p>Souvent associée à la cachexie</p>
Etiologie(s) possible(s)	Causes infectieuses (souvent plusieurs agents pathogènes) : mycoplasmosse, colibacillose respiratoire, aspergillose, bronchite infectieuse de la caille, choléra, pullorose aigüe
Fréquence indicative d'observation (pour le plus fréquent : +++)	+
Délectabilité sur la chaîne en cadence d'abattage (rôle de la cadence d'abattage)	+/-
Impact sur la santé publique humaine et/ou animale	OUI
Ne pas confondre	<p>Accumulation liquidienne dans cavité abdominale</p> <p>Processus tumoral</p> <p>Anomalie de la paroi abdominale ou de la cavité viscérale</p>



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
DE L'AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

infoma

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction Générale de l'Alimentation
251 rue de Vaugirard
75732 PARIS Cedex 15



[Retour sommaire
caille](#)

PROCESSUS TUMORAL

Espèce : CAILLE

**Code NERGAL
?**

Type d'anomalie : anomalie des viscères / processus tumoral

Synonyme(s) et anomalie(s) apparentée(s) : processus tumoral localisé ou généralisé



Conduite à tenir

Motivation en droit

Règlement CE 854/2004, annexe I, section II, chapitre V, 1.f)

Retrait partiel si localisé
Retrait total si multiple ou généralisé

Catégorie de sous-produits
2



Description macroscopique et répercussion sur la carcasse	Masses charnues parfois en chou-fleur dont la localisation, le nombre et la taille sont variables.
Etiologie(s) possible(s)	Cause virale possible
Fréquence indicative d'observation (pour le plus fréquent : +++)	+
DéTECTABILITÉ sur la chaîne en cadence d'abattage (rôle de la cadence d'abattage)	OUI
Impact sur la santé publique humaine et/ou animale	Inconnu
Ne pas confondre	Anomalie de la paroi de la cavité abdominale ou de la masse viscérale



infoma

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction Générale de l'Alimentation
251 rue de Vaugirard
75732 PARIS Cedex 15



[Retour sommaire
caille](#)

ANOMALIES DE LA PAROI DE LA CAVITE ABDOMINALE OU DE LA MASSE VISCERALE

Espèce : CAILLE

**Code NERGAL
?**

Type d'anomalie : anomalie des viscères / inflammatoire
/ infectieuse

Synonyme(s) et anomalie(s) apparentée(s) : Péritonite



Conduite à tenir

Motivation en droit

Règlement CE 854/2004, annexe I, section II, chapitre V, 1.p)

Retrait total



L'envoi d'un lot d'animaux malades est interdit
Rechercher les causes, si beaucoup d'animaux atteints

**Catégorie de sous-produits
2**



Description macroscopique et répercussion sur la carcasse	<p>Péritonite : Parois de la cavité abdominale rouges ou recouvertes de placards de fibrine. Inflammation des séreuses : rouges avec dilatation des vaisseaux sanguins, recouvertes de placards jaunâtres, recouvertes de granulomes blanchâtres</p> <p>Lorsque la lésion devient chronique : adhérences entre les viscères ou à la paroi de la cavité abdominale. Souvent associée à de la cachexie et/ou une carcasse congestive</p> <p>Goutte viscérale : dépôts de cristaux sur les séreuses. La carcasse a un aspect talquée ou saupoudrée de cristaux de sel. Associée à une atteinte des reins.</p>
Etiologie(s) possible(s)	<p>Péritonite et polysérite :</p> <ul style="list-style-type: none"> - toutes causes de septicémie (colisepticémie, rouget, choléra...) - généralisation d'une aérosacculite (mycoplasmosse, colibacillose respiratoire, aspergillose, bronchite infectieuse de la caille...) - Typhose chronique <p>Goutte viscérale : dépôts de cristaux d'urates</p> <ul style="list-style-type: none"> - excès d'apport protéique dans l'alimentation - atteinte rénale (néphrite, amyloïdose)
Fréquence indicative d'observation (pour le plus fréquent : +++)	<p style="text-align: center;">+</p>
DéTECTABILITÉ sur la chaîne en cadence d'abattage (rôle de la cadence d'abattage)	<p style="text-align: center;">+/-</p>
Impact sur la santé publique humaine et/ou animale	<p style="text-align: center;">OUI</p>
Ne pas confondre	<p>Processus tumoral Accumulation liquidienne dans la cavité abdominale Aérosacculite</p>

 MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT		Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Direction Générale de l'Alimentation 251 rue de Vaugirard 75732 PARIS Cedex 15	 Retour sommaire caille
---	---	--	---

ANOMALIES DU TUBE DIGESTIF

Espèce : CAILLE	Code NERGal ?
Type d'anomalie : anomalie des viscères / inflammatoire / parasitaire / infectieuse	Synonyme(s) et anomalie(s) apparentée(s) : Entérite, typhlite.



Conduite à tenir

Motivation en droit

Règlement CE 854/2004, annexe I, section II, chapitre V, 1.f) ou 1.h) si parasitisme

Retrait total si atteinte d'un autre organe, retrait partiel sinon



L'envoi d'un lot d'animaux malades est interdit
 Rechercher les causes, si beaucoup d'animaux atteints

Catégorie de sous-produits
 2



Coloration rouge de la masse viscérale et vaisseaux mésentériques dilatés

Description macroscopique et répercussion sur la carcasse	<p>Contenu du tube digestif anormal : liquide ou formé de pseudo membrane de fibrine, hémorragie du tube digestif +/- dilatation des intestins +/- muqueuses ulcérées ou présentant des pétéchies, +/- parasites dans la lumière du tube digestif Souvent associé à de la cachexie et/ou une carcasse congestive</p> <p>Dilatation des caeca : Contenu caecal anormal : remplis de gaz, de liquide de couleur variable ou encore de fibrine jaunâtre +/- parois caecales épaissies +/- muqueuses ulcérées ou présentant des pétéchies Souvent associée à de la cachexie et/ou des plages blanches sur le foie</p>
Etiologie(s) possible(s)	<p>- Infectieuses : maladie de Newcastle (Paramyxovirus) ou Influenza aviaire (Orthomyxovirus), choléra aviaire (Pasteurella multocida), entérite ulcéralive de la caille (Clostridium colinum), forme diphtérique de la variole aviaire (Poxvirus), colibacillose (E.coli), pullorose (Salmonella pullorum), typhose (Salmonella gallinarum), salmonellose (Salmonella sp.)</p> <p>- Parasitaires : Coccidiose, capillariose, cestodose, aspergillose chronique, histomonose</p>
Fréquence indicative d'observation (pour le plus fréquent : +++)	+
Déteçtabilité sur la chaîne en cadence d'abattage (rôle de la cadence d'abattage)	+/-
Impact sur la santé publique humaine et/ou animale	OUI
Ne pas confondre	-

 <p>LIBERTÉ • ÉGALITÉ • FRATERNITÉ REPUBLIQUE FRANÇAISE</p> <p>MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT</p>		<p>Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Direction Générale de l'Alimentation 251 rue de Vaugirard 75732 PARIS Cedex 15</p>	 <p>Retour sommaire caille</p>
---	---	--	---

ANOMALIES DU FOIE

Espèce : CAILLE

**Code NERGAL
?**

Type d'anomalie : anomalie des viscères / inflammatoire
/ infectieuse

Synonyme(s) et anomalie(s) apparentée(s) : Hépatite,
périhépatite, stéatose hépatique



Conduite à tenir

Motivation en droit

Règlement CE 854/2004, annexe I, section II, chapitre V, 1.p)

Retrait partiel

Retrait total si atteinte d'un autre organe ou lésions
aigües (congestion, présence de fibrine...)



L'envoi d'un lot d'animaux malades est interdit
Rechercher les causes, si beaucoup d'animaux atteints

Catégorie de sous-produits
2



- Hypertrophie,
- Foie nécrosé

Description macroscopique et répercussion sur la carcasse	<ul style="list-style-type: none"> -Périhépatite - Hémorragies et pétéchies sur un foie congestionné - Granulomes caséux et friables à centre nécrotique <p>Foie uniformément jaunâtre ou brun clair, friable de taille légèrement augmentée</p>
Etiologie(s) possible(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Colibacillose, salmonellose, rouget, syndrome lymphoprolifératif, pullorose aigüe, typhose aigüe, histomonose - Bronchite infectieuse de la caille - Colibacillose, salmonellose - Choléra aviaire aigu - Aspergillose chronique <p>Stéatose hépatique Déséquilibre alimentaire, animaux âgés</p>
Fréquence indicative d'observation (pour le plus fréquent : +++)	+
Délectabilité sur la chaîne en cadence d'abattage (rôle de la cadence d'abattage)	OUI
Impact sur la santé publique humaine et/ou animale	OUI
Ne pas confondre	<p>Processus tumoral Plages blanches sur le foie</p>

 <p>LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ REPUBLIQUE FRANÇAISE</p> <p>MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT</p>		<p>Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Direction Générale de l'Alimentation 251 rue de Vaugirard 75732 PARIS Cedex 15</p>	 <p>Retour sommaire caille</p>
---	---	--	---

ANOMALIES DU COEUR ET DU PERICARDE

Espèce : CAILLE

**Code NERGAL
?**

Type d'anomalie : anomalie des viscères / inflammatoire
/ infectieuse

Synonyme(s) et anomalie(s) apparentée(s) :
Péricardite, myocardite



Conduite à tenir

Motivation en droit

Règlement CE 854/2004, annexe I, section II, chapitre V, 1.p ou 1.f

Retrait partiel

Retrait total si atteinte d'un autre organe ou lésions
aigües (congestion, présence de fibrine...)



L'envoi d'un lot d'animaux malades est interdit
Rechercher les causes, si beaucoup d'animaux atteints

Catégorie de sous-produits
2



Description macroscopique et répercussion sur la carcasse	<p>Péricardite : dilatation du péricarde, contenu péricardique variable : exsudat, pus ou fibrine</p> <p>Myocardite : pétéchies (ponctuations rouge vif) ou foyers de nécrose (tâches blanchâtres, dures, friables) sur le cœur</p> <p>Cœur déformé : cœur arrondi, apex cardiaque, effacé ou dilatation d'une oreillette ou d'un ventricule cardiaque</p> <p>Souvent associé à de la cachexie et/ou une carcasse congestive</p>
Etiologie(s) possible(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Souvent conséquence d'une septicémie : Choléra aigu, influenza aviaire, maladie de Newcastle, colisepticémie, mycoplasmosse, - Pétéchies et suffusions cardiaques : Choléra - Malformations congénitales
Fréquence indicative d'observation (pour le plus fréquent : +++)	+
Délectabilité sur la chaîne en cadence d'abattage (rôle de la cadence d'abattage)	+
Impact sur la santé publique humaine et/ou animale	OUI
Ne pas confondre	



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
DE L'AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

infoma

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction Générale de l'Alimentation
251 rue de Vaugirard
75732 PARIS Cedex 15



[Retour sommaire
caille](#)

PODODERMATITE

Espèce : CAILLE

**Code NERGal
?**

Type d'anomalie : anomalie d'aspect / lésion cutanée
traumatique

Synonyme(s) et anomalie(s) apparentée(s) :



Conduite à tenir

Motivation en droit

Règlement CE 854/2004, annexe I, section II, chapitre V, 1 p)

Retrait partiel



**Si beaucoup d'animaux atteints rechercher les
causes (bien être animal)**

**Catégorie de sous-produits
2**



Description macroscopique et répercussion sur la carcasse	Brûlure pouvant aller jusqu'à l'ulcération de la face plantaire
Etiologie(s) possible(s)	Mauvaise qualité de litière Surdensité en élevage
Fréquence indicative d'observation (pour le plus fréquent : +++)	+
DéTECTABILITÉ sur la chaîne en cadence d'abattage (rôle de la cadence d'abattage)	Oui
Impact sur la santé publique humaine et/ou animale	Oui
Ne pas confondre	Lésion cutanée infectée